

Amphigastrium florale intimum oblongo-ellipticum, lobulis æquilongum ad medium bifidum, rima angusta obtusa, lobis lanceolatis attenuatis. *Andræcia* capitata, parva, bracteis paucijugis. — STEPH.

Haut-Oubangui. — Bangui, 10 août 1902, leg. Aug. CHEVALIER.

Frullania (*Galeiloba*) **bangiensis** Steph. nov. sp.

Dioica, mediocris, brunnea, flaccida, corticola. *Caulis* ad 5 cm. longus, irregulariter longe ramosus; ramis ad 2 cm. longis regulariter breviterque pinnulatis. *Folia caulina* conferta, squarrose recurva, in plano subcircularia, antice caulem late superantia, basi antica rotundato-appendiculata. *Cellulæ* superæ 18 μ trigonis parvis, basales 18 \times 36 μ trigonis majusculis, in medio parietum nodulosi, parietibus flexuosis. *Lobulus* magnus, caule duplo latior, alte cucullatus, cauli subcontiguus, vertice rotundatus, 0,53 mm. longus et latus, ore recte truncato, apice breviter acuteque rostratus. *Amphigastria* caulina magna, 0,8 mm. lata et longa, subrotunda, inferne obtusata, transverse inserta, apice ad 1/3 inciso-biloba, sinu recto lobis late triangulatis obtusis. *Perianthia* 2,4 mm. longa, obovata, apice truncata, triplicata, rostro valido breviusculo, dense ramentacea. *Folia floralia* oblongo-elliptica integerrima, lobulo æquilongum ad 2/3 soluto, late lanceolato acuminato acutissimo. *Amphigastrium* florale intimum uno latere lobulo breviter coalitum, obovatum, marginibus denticulatis, apice ad medium inciso-bilobatum, rima angusta, lobis porrectis breviter acuminatis. *Andræcia* ignota.

Haut-Oubangui. — Bangui: ad ripas fluvii Oubangui, 10 Aug. 1902, leg. Aug. CHEVALIER.

CHAMPIGNONS RECUEILLIS DANS LES CULTURES DU MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS EN 1911,

PAR M. A. WRÓBLEWSKI.

DEUXIÈME NOTE.

Cette liste renferme 79 espèces de Champignons dont 6 nouvelles.

PERONOSPORINEÆ.

1. *CYSTOPUS CANDIDUS* LÉV. — Sur *Barbarea præcox*, *Draba alpina*, *Arabis nivea* et *Raphanus sativus*.

2. *PLASMOPARA VITICOLA* Berl. et de Toni. — Sur *Vitis vinifera*.

3. *PERONOSPORA PARASITICA* Tul. — Sur *Raphanus sativus*.

USTILAGINEÆ.

4. *USTILAGO MAYDIS* Tul. — Sur *Zea Mays* à feuilles panachées.

UREDINALES.

5. *Puccinia graminis* Pers. II, III. — Sur *Ægilops ventricosa* et *Æg. triuncialis*.

6. *P. Centaureæ* Mart. II, III. — Sur *Centaurea phrygia* et *C. Jacobæa*.

7. *P. punctata* Link. (= *P. Galii* Auct.) II, III. — Sur *Galium verum*.

8. *Coleosporium campanulæ* (Pers.) Lév. II. — Sur *Campanula Trachelium*, *C. americana*, *C. sarmatica*, *Lobelia syphilitica* et *Wahlenbergia pendula*.

9. *C. Sonchi* (Pers.) Lév. II. — Sur *Sonchus oleraceus*.

10. *C. Senecionis* (Pers.) Fr. II. — Sur *Senecio Jacobæa*, *S. vulgaris*, *S. gallicus* et *S. chrysanthemifolius*.

11. *Cronartium ribicolum* Dietr. II, III. — Sur *Ribes rubrum*.

BASIDIOMYCETES.

12. *Polyporus igniarius* (L.) Fries. — Sur *Rhamnus hybrida*.

13. *P. sulphureus* (Bull.). — Sur *Tanarix æstivalis*.

14. *P. squamosus* (Huds.). — Sur *Sorbus sp.*

15. *P. hispidus* (Bull.) Fr. — Sur *Sophora japonica*.

ASCOMYCETES.

16. *Sphaerotheca humuli* var. *fuliginea* (Schlecht). — Sur *Veronica macrantha*.

17. *Uncinula aceris* (D. C.) Sacc. — Sur *Acer Pseudoplatanus*.

18. *U. necator* (Schw.) Burr. — Sur *Vitis Labrusca* et *V. vinifera*.

19. *Microsphaera berberidis* (D. C.) Lev. — Sur *Berberis vulgaris*.

20. *M. evonymi* (D. C.) Sacc. — Sur *Evonymus europæus*.

21. *M.alni* (Wall.) — Sur *Rhamnus hybrida*.

22. *M. mougeothii* Lév. — Sur *Lycium barbarum*.

23. *Erysiphe polygoni* D. C. — Sur *Geranium pusillum*, *Heracleum flavum* et *Tripolium incarnatum*.

24. E. CICHORIACEARUM D. C. — Sur *Lappa major* et *L. minor*.
25. CLAVICEPS PURPUREA (Fr.) Tul. — Sur *Elymus sabulosus*, *Lolium perenne*, *L. temulentum* et *L. italicum*.
26. LEPTOSPHERIA CULMORUM Auersw. — Sur *Trisetum distichophyllum*.
27. L. CULMIFRAGA (Fr.) Ces. et de Not. — Sur *Phalaris arundinacea*.
28. L. AMPHIBOLA Sacc. — Sur *Sorghum halepense*.
29. L. CULMICOLA (Fr.). — Sur *Andropogon argenteus*.

FUNGI IMPERFECTI.

30. PHYLLOSTICTA JAPONICA Thüm. — Sur *Mahonia japonica*.
31. P. MAGNOLIÆ Sacc. — Sur *Magnolia grandiflora*.
32. PHOMA PELLICULOSA B. et Br. — Sur *Phyllostachys aurea*.
33. P. BIOCELLATA Mont. — Sur *Tripsacum dactyloides*.
34. P. ASPHODELINA Thüm. — Sur *Asphodeline lutea*.
35. P. CULMICOLA Schw. — Sur *Andropogon argenteus*.
36. P. JASMINI Cke. — Sur *Jasminum officinale*.
37. P. CATALPICOLA Oud. — Sur *Catalpa speciosa*.
38. P. SYRINGIANA Sacc. — Sur *Syringa vulgaris*.
39. P. TAMARISCI (Mont.) — Sur *Tamarix gallica*.
40. P. OPHISTES Sacc. — Sur *Hibiscus syriacus*.
41. P. CYCLOSPORA Sacc. — Sur *Euphorbia dulcis*.
42. P. AILANTI Sacc. — Sur *Ailantus glandulosa*.
43. P. PUSTULATA Sacc. — Sur *Acer Pseudoplatanus*.
44. P. LIBELLOIDES Sacc. et Penz. — Sur *Evonymus japonica*.
45. P. NEBULOSA (Pers.) Mont. — Sur *Æthionema pulchellum* et *Sidalcea candida*.
46. P. ACUTA Fuck. — Sur *Fœniculum vulgare*.
47. P. ENTEROLEUCA Sacc. — Sur *Malus (floribunda?)*.
48. P. PRUNI-LUSITANICÆ Cke. — Sur *Prunus lusitanica*.
49. P. RUDIS Sacc. — Sur *Cytisus leucanthus*.
50. P. INDIGOFERICOLA P. Henn. — Sur *Indigofera Dosua*.
51. CYTOSPORA ATRA (Bon.) Sacc. — Sur *Morus alba*.
52. C. CINCTA B. et C. — Sur *Armeniaca vulgaris*.

53. *C. ANCEPS* Sacc. — Sur *Cerasus ilicifolia*.
54. *SPHEROPSIS COTONEASTRICALA* nov. sp. — Pycnidiis numerosis, minutis, in cortice immersis, epidermide elevata dein fissa cinctis, globosis; conidiis elliptico-obovatis vel oblongis, continuis, rectis, fuliginosis, $16-20 \times 10-12$. In ramulis emortuis Cotoneastri thymifolii.
55. *CONIOTHYRIUM OLIVACEUM* Bon. — Sur les feuilles d'*Eucalyptus acuminoides*.
56. *C. GLOMERULATUM* Sacc. — Sur *Pinus Laricio*.
57. *C. HYSTEROIDEUM* Karst. et Kar. — Sur *Dasyliirion glaucophyllos*.
58. *DIPLODIA RAMULICOLA* Desm. — Sur *Evonymus japonicus*.
59. *D. SARMENTORUM* Fr. — Sur *Menispermum canadense*.
60. *D. MACROSTOMA* Lév. — Sur *Ficus carica*.
61. *D. ZELKOVÆ* nov. sp. — Pycnidiis gregariis, depresso globosis, papillatis, subcutaneo-erumpentibus, nigricantibus, majusculis; conidiis ellongato-ellipticis, obtusis, uniseptatis, eguttulatis, leniter constrictis, fuscis. $16-20 \times 8-10$. In ramulis emortuis Zelkovæ crenatæ.
62. *D. CYDONIÆ* Sacc. — Sur *Cydonia vulgaris*.
63. *D. PREUSSII* Sacc. — Sur *Rubus nutkanus*.
64. *D. RUDIS* Desm. et Kickx. — Sur *Cytisus leucanthus*.
65. *D. HARTOTI* nov. sp. — Pycnidiis gregariis subsuperficialibus, globoso-applanatis, minutis, nigris; conidiis fusoides vel ellongato-ellipticis, utrinque subattenuatis, uniseptatis, olivaceo-fuscis, $15-22 \times 6-8$. In caulibus emortuis Dorycnii herbacei.
66. *D. WISTARIE* P. Brunaud. — Sur *Virgilia lutea*.
67. *D. CALICOTOMES* nov. sp. — Pycnidiis sparsis, globosis, atris, epidermide tectis, erumpentibus; conidiis ellipticis utrinque subattenuatis, uniseptatis, hyalinis vel chlorinis, $7-8 \times 4-5$. In ramulis emortuis Calicotomes hirsuti.
68. *CAMAROSPORIUM PAULOWNIÆ* nov. sp. — Pycnidiis sparsis, in cortice sub epidermide nidulantibus, demum subliberis, minutis, globosis, atris; conidiis ovato-oblongis, utrinque rotundatis, fuliginosis, 2-3 septato-muriformibus, $12-16 \times 6-7$. In ramulis emortuis Paulowniæ imperialis.
69. *C. INCRUSTANS* Sacc. — Sur *Rhus typhina*.
70. *C. NESEECOLUM* nov. sp. — Pycnidiis initio sparsis vel lineatim scriatis, epidermidem longitudinaliter perforantibus, globosis, papillatis, atris; conidiis versiformibus ovoideis vel oblongis 2-3 septato-muriformibus, fuscis, $12-14 \times 7-8$. In ramulis emortuis Neseæ myrtifoliæ.